

## Меры, рекомендованные ВООЗ во время вспышек респираторных инфекций, вызванных коронавирусами:

- 1. Пациенты должны носить маски N-95 после появления симптомов и должны быть немедленно изолированы, предпочтительно в помещениях с отрицательным давлением.
- 2. Работники здравоохранения (врачи, медработники и все работники, которые могут контактировать с пациентом) должны носить маски N-95, головные уборы, защитные очки, костюмы и перчатки.
- 3. Кровати, поручни, столы, полы и любое оборудование, которое находится в комнате пациента или используется им, следует ежедневно дезинфицировать раствором гипохлорита.
- 4. У интубированного пациента следует использовать закрытые системы всасывания для предотвращения распространения заболевания.

Для профилактики и борьбы с вирусом ВООЗ рекомендует неукоснительно применять меры профилактики инфекций, связанные с оказанием медицинской помощи. Во время клинической помощи вероятных или подтвержденных случаев инфекции, в дополнение к стандартным мерам предосторожности, следует применять некоторые дополнительные меры.

Насколько это возможно, число работников здравоохранения, членов семьи и посетителей, имеющих контакт с вероятным или подтвержденным случаем заражения коронавирусом, должно быть ограничено. В дополнительных мерах подчеркивается необходимость того, чтобы все посетители и работники здравоохранения, находящиеся в контакте (на расстоянии менее одного метра), вход в комнату, помещение вероятного или подтвержденного случая инфекции всегда должны:

- 1. Использовать хирургическую маску.
- 2. Носить защитные очки.
- 3. Носить халат или костюм с длинными чистыми рукавами и нестерильными перчатками (хотя для некоторых процедур могут потребоваться стерильные перчатки)
- 4. Выполнять гигиену рук до и после контакта с пациентом или окружающими предметами, а также сразу после снятия средств индивидуальной защиты.

Относительно перевозки пациентов (вероятные или подтвержденные случаи инфекции коронавируса):

- 1. Следует избегать перемещения и транспортировки пациентов за пределы зоны изоляции, если только в этом нет медицинской необходимости. Учитывая последнее, следует использовать маршруты, которые сводят к минимуму воздействие на персонал, других пациентов или посетителей. В этих случаях следует рассмотреть возможность использования портативного диагностического оборудования (рентген, ультразвук или др.).
- 2. Сообщите принимающей области или учреждению о вероятном или подтвержденном диагнозе пациента и о мерах предосторожности, необходимых для ведения пациента (стандартные и дополнительные меры предосторожности).
- 3. Очистите и продезинфицируйте поверхности, с которыми контактировал пациент (например, кровати).